

종이책

2027년 대비

PACIFIC

크물레

예 | 상 | 문 | 제 | 풀 | 이

정 / 오 / 집



Cardiology Pulmonology Gastroenterology Nephrology

Infection Endocrinology Allergy Hematology Oncology

Rheumatology Surgery Obstetrics Gynecology Pediatrics

Psychiatry Minor Preventive Medicine Medical Law



01

순환기

페이지	위치	수정 전	수정 후
62	2번 문제 해설 4번째줄	LAE(eft atrial enlargement)	LAE(left atrial enlargement)
62	3번 문제 해설 2번째줄	② ~S파가 깊고	② ~S파가 깊고 ,
69	7번 문제 해설 9번째줄	Ca 은 역치 전위	Ca²⁺ 은 역치 전위
79	1번 문제 해설 3번째줄	수축 기 시	수축 기 시
105	8번 문제 해설 7번째줄	베타 차단제는 심장 의 직접 작용하여~	베타 차단제는 심장에 직접 작용하여~
121	13번 문제 해설 4번째줄	AV origin 은 아니라는 것을~	AV node 또는 그 상부 origin 은 아니라는 것을~
135	4번 문제 해설 2번째줄	QRS complex 가 이상한 QRS complex가 두 개를 세트로~	이상한 QRS complex가 두 개를 세트로~
145	2번 문제 해설 1번째줄	규칙적인 톱니바퀴 모양의 F파 , (Saw-tooth 파형)이 관찰됩니다.	규칙적인 톱니바퀴 모양의 F파(saw-tooth 파형) 가 관찰됩니다.
164	1번 문제 해설 3번째줄	돌발심실상빈맥(paroxysmal-tachycardia)를	돌발심실상빈맥(paroxysmal-tachycardia)을
165	3번 문제 해설 6번째줄	병력도 PSVT와 알차합니다.	병력도 PSVT와 일치합니다.
251	10번 문제 해설 5번째줄	K 농도가 정상이고~	K⁺ 농도가 정상이고~
273	4번 문제 해설 13번째줄	LV failure에 의해 폐혈관 음영이 증가하는 경우와 달리 상대적으로 깨끗한 lung field, 숨이 차고 양쪽 다리가 붓고 hepatomegaly 소견, chronic cor pulmonale에서 특도 RVH가 있을 수 있으나 동반되는 정보가 제시되지 않았네요. 정적인 tachypnea, tricuspid valve의 regurgitation murmur 등은 모두 cor pulmonale를 시사하는 정보입니다. RV infarct 등에서	LV failure에서 폐혈관 음영이 증가하는 것과 달리 상대적으로 깨끗한 lung field가 보이고, 호흡 곤란, 양측 하지부종, hepatomegaly, chronic cor pulmonale에서 특징적인 RVH, tachypnea, tricuspid regurgitation murmur 등의 소견은 모두 cor pulmonale를 시사합니다. RV infarction 등에서도 우심부전 소견이 나타날 수 있으나, 이를 뒷받침하는 동반 정보는 제시되지 않았습니다.
564	1번 문제 해설 6번째줄	Spirolactone 과 furosemide는	spironolactone 과 furosemide는



02 호흡기

페이지	위치	수정 전	수정 후
69	2)-(2) 2번째줄	interstitial pulmonay edema	interstitial pulmonary edema
113	23번 문제 해설 9번째줄	특이면역글로 불 린E항체를	특이면역글로 불 린E항체를
114	25번 문제 해설 2번째줄	metacholine 을 흡입하게	methacholine 을 흡입하게
128	18번 문제 해설 4번째줄	구강 캔 디다증	구강 칸 디다증
160	6.-3) 1번째줄	gray hepatization	grey hepatization
186	도표 4번째줄	Hyponatremia(131mg/dL)	Hyponatremia(131mEq/dL)
298	3번 문제 해설 9, 14번째줄	무스카린 대 항제	무스카린 길 항제
377	밑에서 3번째줄	이후는 위의 알고리듬 과 같이 평가하게 됩니다.	이후는 위의 알고리즘 과 같이 평가하게 됩니다.
428	24번 문제 해설 10번째줄	③ rivaroxaban or apixaban monotehrapy	③ rivaroxaban or apixaban monotherapy
535	1.-3)-(4)	(∴ intrathoracic presssue increase로	(∴ intrathoracic pressure increase로



03

소화기

페이지	위치	수정 전	수정 후
37	알고리즘 6번째 사각형 2열	coexisting illnesses, coexisting illnesses	coexisting illnesses
48	01번 문제 2번 선지	락플로스관장	락톨로스관장
58	알고리즘 “식도정맥류” 아래상자	IV octreotid	IV octreotide
81	02번 문제 5번 선지	양자 펌프 억제제	양성자 펌프 억제제
144	3)-(1)-①	• 기에 대부분 무증상	• 초기에 대부분 무증상
158	3)-(2)	(2) 소수의 환자에서 B-sympom(발열, 야간발한)	(2) 소수의 환자에서 B-symptom(발열, 야간발한)
218	8번 문제 1번 선지	구불 잘 룩창자암(sigmoid colon cancer)	구불 잘 룩창자암(sigmoid colon cancer)
364	2. 임상양상 아래 그림		
498	4) 기종성 쓸개염 (2) 진단	simple abdomen	simple abdomen X-ray

04 신장·감염

페이지	위치	수정 전	수정 후
62	※ 요약하면 아래와 같습니다.	Metabolic acidosis/alkalosis는~HCO ₃ ⁻ (정상치 25mmol/L) 변동이 약 1:1로 일어납니다.	Metabolic acidosis/alkalosis는~HCO ₃ ⁻ (정상치 24mmol/L) 변동이 약 1:1로 일어납니다.
133	2번 문제 4번 선지	당뇨병케톤산증	당뇨병성 케톤산증
180	2.-3)	Complement, selorogy : 정상	Complement, serology : 정상
355	2.-3)	성홍열(sacrlet fever)을 일으키는 원인균	성홍열(scarlet fever)을 일으키는 원인균



05

내분비 · 알레르기

페이지	위치	수정 전	수정 후
25	그림 및 5번째줄	주황색 동그라미는~ 노란색 구조물은 cavernous sinus를 나타냅니다.	주황색 동그라미는~ 노란색 구조물은 cavernous sinus를 나타냅니다(교재 뒤의 컬러 사진자료 참고).
	그림 및 6번째줄	Sagittal : 빨간색 점선으로	Sagittal : 빨간색 점선(교재 뒤의 컬러 사진자료 참고)으로
61	2번 문제 해설 4번째줄	의식이 없는 severe neurologic symptom을 보이므로	4~5시간 전부터 서서히 의식이 저하되는 severe neurologic symptom을 보이므로
149	17번 문제 해설 3번째줄	저용량 텍사메타손 억제 검사에서 코티솔 분비가 $5\mu\text{g/dL}$ 를 초과하여	저용량 텍사메타손 억제 검사에서 코티솔 분비가 $1.8\mu\text{g/dL}$ 를 초과하여
151	21번 문제 해설 3번째줄	저용량 텍사메타손 억제 검사에서 코티솔 분비가 $\geq 5\mu\text{g/dL}$ 이므로	저용량 텍사메타손 억제 검사에서 코티솔 분비가 $\geq 1.8\mu\text{g/dL}$ 이므로
152	23번 문제 해설 2번째줄	야간 1mg 텍사메타손억제검사(선별검사)에서 코티솔이 $5\mu\text{g/dL}$ 이상으로 나타났으므로	야간 1mg 텍사메타손억제검사(선별검사)에서 코티솔이 $1.8\mu\text{g/dL}$ 이상으로 나타났으므로
	24번 문제 해설 4번째줄	혈장 코티솔이 $5\mu\text{g/dL}$ 이하므로	혈장 코티솔이 $1.8\mu\text{g/dL}$ 이하므로
223	24번 문제 지문 8번째줄	$\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-$ 140/106/3.7meq/L	$\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-$ 140/3.7/106meq/L
241	2.-(3)-②	proliferative : panretinal laser photocoagulation (PRLP)	proliferative : panretinal photocoagulation(PRP, 범망막광응고술)
270	1번 문제 해설 13번째줄	당뇨일 경우 100, 당뇨가 아닐 경우 130 미만으로	당뇨일 경우, 심혈관계 위험인자를 동반한 당뇨이므로 70 미만, 아닐 경우 130 미만으로
276	14번 문제 해설 8번째줄	생활습관개선을 시도해보고 스타틴 투여를 시작하도록 되어 있습니다. 보기 중 적절한 답은 5번입니다.	심혈관계 위험인자 3개 이상이므로 LDL 조절 목표가 <130 , $\text{TG}>200$ 이지만 500 미만이므로 LDL 먼저 조절 후, fibrate을 쓴다. 생활 습관 개선이 우선적인 치료이지만, 선지 중에서는 4번을 고르는 것이 가장 적절하다.

06 혈액 · 종양 · 류마티스

페이지	위치	수정 전	수정 후
26	알고리즘 1번째줄	Review peripheral blood smear nd assess MCV	Review peripheral blood smear and assess MCV
87	알고리즘 하단 왼쪽	섬유소 용해 → Fibrinolysis → Fibrinogen	섬유소 용해 → Fibrinolysis → Plasminogen
260	1번 문제 해설 4번째줄	뇌척수액 단백질 상승이 특징적입니다.	뇌척수액 검사 결과 뇌압, 백혈구, 단백질의 상승이 특징적입니다.
273	1번 문제 해설 5번째줄	(leukopenia, thrombocytopenia)	(anemia , leukopenia, thrombocytopenia)
289	3번 문제 해설 5번째줄	Anti-topoisomerase-I 양성을 보이고 있어 전신경화증이 의심됩니다.	Anti-topoisomerase-I 양성을 보이고 있어 미만성 전신경화증이 의심됩니다.
352	3번 문제 해설 8번째줄	행동약식 을 교정하는 것이 가장 중요합니다.	행동 양식 을 교정하는 것이 가장 중요합니다.





07

외과 총론

페이지	위치	수정 전	수정 후
55	12번 문제 해설 12번째줄	cutaneous ischemia를 시사하는 소견입니다.	cutaneous ischemia를 시사하는 소견입니다.
64	2)-(4)	예방 : 디펜히드라민(diphenhydramine)	예방 : 항히스타민제(diphenhydramine)
82	5번 문제 해설 10번째줄	aPPT도 연장된 수치를 보입니다.	aPTT도 연장된 수치를 보입니다.
	5번 문제 해설 마지막줄	신선동결혈장(FFP)의 투여가 필요합니다.	신선동결혈장(FFP)의 투여가 필요합니다.
237	2)-(2)	(2) Laboratory analyses	(2) Laboratory analysis
247	도표 4행 1열	un-reconstructable peripheral vascular disease	un-reconstructible peripheral vascular disease

08 외과 각론

페이지	위치	수정 전	수정 후
102	그림 D		
132	위에서 두번째줄	- Achalasia : ~ per oral esophageal myotomy	- Achalasia : ~ per oral endoscopic myotomy
134	3번 문제 해설 5번째줄	경구식도근절개술(per oral endoscopic myotomy)	경구식도근절개술(per oral endoscopic myotomy)
215	3.-3)	식욕부진(Anorexia) : 거의~ appe 가 아닐	식욕부진(Anorexia) : 거의~ 충수염 이 아닐
231	1번 문제 해설 5번째줄	90세로 고령인 것을 생각하면 sigmoid volvulus 의	90세로 고령인 것을 생각하면 sigmoid volvulus 의
288	2.-1)-(2)-*	* 임신부에게 phodophyllin 과 imiquimod는	* 임신부에게 podophyllin 과 imiquimod는
304	도표하단	PST(performance status)	PST(performance status test)
346	15번 문제 해설 4번째줄	이자, 쓸개, 온쓸개간 은 정상이었으니 위와 같은	이자, 쓸개, 온쓸개관 은 정상이었으니 위와 같은
362	9번 문제 해설 13번째줄	3) 간샘창자연결술(Roux-en-Y heaticojejunostomy)	3) 간샘창자연결술(Roux-en-Y hepaticojejunostomy)
383	6번 문제 해설 6번째줄	choledocal cyst	cholechochal cyst

09 산과

페이지	위치	수정 전	수정 후
16	그림		
30	난자형성 및	* Willams 26판에서는	* Willams 26판에서는
32	그림 하단		
79	01번 문제 해설 11번째줄	16 α -hydroxylation	16 α -hydroxylation
90	알고리즘 우측 하단	비정상 결과 counseling 이 필요하고	비정상 결과 counseling 이 필요하고
100	01번 문제 지문 2번째줄	결정점(cut-off)	결정점(cut-off)
102	도표 각주 a	^a May be omitted of all four ultrasound	^a May be omitted if all four ultrasound
108	1.-1)	→ tachycardia가 생기는 원인~ 예 : atropine) or sympathomemetic drug(교감신경 흥분제	→ tachycardia가 생기는 원인~ 예 : atropine) or sympathomimetic drug(교감신경 흥분제
124	도표 하단 출처	Americal Institute of Ultrasound in Medicine	American Institute of Ultrasound in Medicine
127	Anencephaly 초음파 그림		
136	03번 문제 지문 1) 04번 문제 지문 4)	1) Obstretical conjugate 4) Obstretical conjugate	1) Obstretical conjugate 4) Obstretical conjugate
145	위에서 2번째줄	* 2018년에~ 이었는데 6cm로 바뀌었습니다(Consensus Committe of the ACOG	* 2018년에~ 이었는데 6cm로 바뀌었습니다(Consensus Committee of the ACOG
154	01번 문제 해설 1번째줄	치골결합(sympthesis pubis)	치골결합(sympthesis pubis)
172	07번 문제 해설 3번째줄	Prolonged latenet phase	Prolonged latent phase
183	03번 문제 지문 2번째줄	혈압 110/60mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 80회/분	혈압 110/60mmHg, 맥박 75회/분, 호흡 20회/분
184	08번 문제 선지 4) 08번 문제 해설 2번째줄	4) McRobert maneuver 맥로버트 수기(McRobert maneuver)를	4) McRoberts maneuver 맥로버트 수기(McRoberts maneuver)를
198	02번 문제 해설 8번째줄	2018년에 개정된 Willams 26판에서	2018년에 개정된 Williams 26판에서
198	01번 문제 지문 8번째줄	혈색소 120g/dL , 백혈구 20,000/mm ² , 혈소판 150,000/mm ²	혈색소 12.0g/dL , 백혈구 20,000/mm ³ , 혈소판 150,000/mm ³

페이지	위치	수정 전	수정 후
199	04번 문제 그림		
202	10번 문제 해설 11번째줄	때문에(26주 or 750g 이상은 되어야 viability	때문에(24주 or 750g 이상은 되어야 viability
207	1.-3)-*	* Williams 23판 813쪽에 실려 있는 내용인데 Williams 26판에서는	* Williams 23판 813쪽에 실려 있는 내용인데 Williams 26판에서는
209	4)-(3)-②-•	• 유산 파트에서~ Funnelling(이완된 internal	• 유산 파트에서~ Funnelling(이완된 internal
211	04번 문제 해설 1번째줄	임산 30주인 다분만부에서 발생한 preterm labor 에 대한 처치를 묻는 문제이다. Preterm labor가 발생한 경우 임산 34주 이전에는	임신 30주인 다분만부에서 발생한 preterm labor 에 대한 처치를 묻는 문제이다. Preterm labor가 발생한 경우 임신 34주 이전에는
213	09번 문제 해설 4번째줄	산모가 임신 주수 30주로 34주 이하이고	산모가 임신 주수 31주로 34주 이하이고
218	01번 문제 해설 4번째줄	비수축 검사 상 hypoxia을 의심할만한 소견은	비수축 검사 상 hypoxia를 의심할만한 소견은
219	04번 문제 지문 1번째줄	32세 미분만부가 임신 41주 1일에 병원에 왔다.	32세 미분만부가 임신 41주 1일에 병원에 왔다.
	05번 문제 지문 3번째줄	NST는 양성이고 예상태아체중은 3.5kg,	NST는 양성이고 예상태아체중은 3.5kg,
224	04번 문제 해설 1번째줄	임산 33주인 미분만부의 태아에서 산전진찰	임신 33주인 미분만부의 태아에서 산전진찰
222	알고리즘 왼쪽 2번째박스	Deliver if maternal status indicates;	Deliver if maternal status indicates;
	알고리즘 가운데 3번째박스	• Maternal or obstetrical indications necessitate delivery	• Maternal or obstetrical indications necessitate delivery
228	11번 문제 해설 1번째줄	비수축검사서서 loss of variability을 보이고	비수축검사서서 loss of variability를 보이고
	11번 문제 해설 14번째줄	① reversed end-diastolic low	① reversed end-diastolic flow
237	01번 문제 해설 12번째줄	합병증으로 본 문제에서 dizyotic twin으로	합병증으로 본 문제에서 dizygotic twin으로
243	5)-(2)-⑤	* Williams 26판에서는 hydramnios 자체가	* Williams 26판에서는 hydramnios 자체가
255	본문 밑에서 8번째줄	- 자궁외임신~ D&C(Dilation and Curetage)는	- 자궁외임신~ D&C(Dilation and Curettage)는
256	알고리즘	abdominal / ectopic / pregnancy / Treat Chorionic villi absent	abdominal / ectopic / pregnancy / Treat Chorionic villi present
271	04번 문제 해설 3번째줄	짧아지는 것과 Funnelling	짧아지는 것과 Funnelling
273	08번 문제 해설 9번째줄	length가 25mm 미만으로 짧은 것과 Funnelling	length가 25mm 미만으로 짧은 것과 Funnelling
275	14번 문제 선지 3)	3) anti-Ra(SS-B)	3) anti-La(SS-B)



페이지	위치	수정 전	수정 후
277	알고리즘	Lipid Peroxidases	Lipid Peroxidases
280	도표 5행 2열 도표 8행 3열	serum creatinine $1.5 \geq \mu\text{Lmg/dL}$ growth restriction $\geq 5\text{th}$ percentile for EGA	serum creatinine $\geq 1.5\text{mg/dL}$ growth restriction $< 5\text{th}$ percentile for EGA
283	01번 문제 지문 7번째줄	• 혈액 : 혈색소 11.2g/dL, 백혈구 9,000/mm ² , 혈소판 180,000/mm ²	• 혈액 : 혈색소 11.2g/dL, 백혈구 9,000/mm ³ , 혈소판 180,000/mm ³
287	09번 문제 해설 6번째줄	선지 중 항고혈압제에 해당하는 니페디틴(CCB)와 에날라프릴(ACEI) 중, ACEI의 경우 임신부에게 금기이므로 니페디틴을 통한 혈압 조절이 필요합니다.	선지 중 항고혈압제에 해당하는 니페디핀(CCB)와 에날라프릴(ACEI) 중, ACEI의 경우 임신부에게 금기이므로 니페디핀을 통한 혈압 조절이 필요합니다.
294	태반조기박리-1.-3)-(1)	(1) Pregnancy induced hypertension(PIH),	(1) Pregnancy induced hypertension(PIH),
300	07번 문제 지문 5번째줄	전자태심박동-자궁수축감시검사	전자태아심박동-자궁수축감시검사
324	01번 문제 해설 4번째줄	oxytocin나	oxytocin이나
325	04번 문제 해설 5번째줄	보이는 것으로 보아 자궁 뒤집힘이 가장 의심이 됩니다.	보이는 것으로 보아 자궁 뒤집힘이 가장 의심이 됩니다.
327	01번 문제 해설 3번째줄	저혈압과 함께 PT, aPPT 증가, 섬유소원 감소,	저혈압과 함께 PT, aPTT 증가, 섬유소원 감소,
351	02번 문제 해설 밑에서 2번째줄	뒷부분에 임신부 금기 약물 중에 warfarin이 나오는 것과 연결하여 생각하면 좋습니다!	뒷부분에 임신부 금기 약물 중에 warfarin이 나오는 것과 연결하여 생각하면 좋습니다!
360	04번 문제 해설 6번째줄	cafazolin or ceftriaxone,	cefazolin or ceftriaxone,
364	01번 문제 지문 7번째줄	프로트롬빈 시간 26초(참고치, 12.7~5.4)	프로트롬빈 시간 26초(참고치, 12.7~15.4)
371	02번 문제 해설 1번째줄	임신당뇨병으로 진단받은 여자가 산후진탈을	임신당뇨병으로 진단받은 여자가 산후진찰을
373	07번 문제 해설 12번째줄 09번 문제 해설 1번째줄	③ GDM, impaired glucose metabolism, glucosuria 50g 경구 당부하 검사에서 140g 이상	③ GDM, impaired glucose metabolism, glucosuria 50g 경구 당부하 검사에서 140mg/dL 이상
379	02번 문제 선지 5)	5) Methymazole로 바꾼다	5) Methimazole로 바꾼다
380	2.-1)-(1)-②-2번째 •	• three of more consecutive miscarriages	• three or more consecutive miscarriages
382	1.-3)-(3)	(3) 출산 후 CNS 증상이 있는 신생아에게 IV ganciclovir가 청력의 악화를 예방할 수 있음	(3) 출산 후 CNS 증상이 있는 신생아에게 IV ganciclovir가 청력의 악화를 예방할 수 있음
390	08번 문제 선지 5)	5) HHV6 Ig1M	5) HHV6 IgM
396	임심과 약물 도입부	β -agonist의 부작용과 적응증에 대해서도 대해서 잘 알아두시기 바랍니다.	β -agonist의 부작용과 적응증에 대해서도 잘 알아두시기 바랍니다.
397	도표 12행 1열 도표 15행 2열 도표 20행 2열	미소프로스톨(Misoprostol) 부갑상샘 저형성증 VACTERAL 증후군	미소프로스톨(Misoprostol) 부갑상샘 저형성증 VACTERL 증후군
403	3번 문제 해설 7번째줄	선지 중 항고혈압제에 해당하는 니페디틴(CCB)와 에날라프릴(ACEI) 중, ACEI의 경우 임신부에게 금기이므로 니페디틴을 통한~	선지 중 항고혈압제에 해당하는 니페디핀(CCB)와 에날라프릴(ACEI) 중, ACEI의 경우 임신부에게 금기이므로 니페디핀을 통한~

페이지	위치	수정 전	수정 후
404	5번 문제 해설 4번째줄	배양검사에서 <i>E.coli</i> 가 확인되어 료로감염 으로	배양검사에서 <i>E.coli</i> 가 확인되어 요로감염 으로
417	1.-8)	8) Pelvic imflammatory disease	8) Pelvic inflammatory disease



10

부인과

페이지	위치	수정 전	수정 후
31	2번 문제 해설 1번째줄	25세 여자가 성폭행을 당했다며 병원에 왔습니다.	26세 여자가 성폭행을 당했다며 병원에 왔습니다.
39	2.-1)-(1)-㉓	㉓ 총 정자수 : $39 \times 10^6/\text{mL}$ 이상	총 정자수 : 39×10^6 (사정당) 이상
47	10번 문제 선지 3)	3) 자궁자궁관조영술	3) 자궁난관조영술
54	1번 문제 해설 1번째줄	29세 여자가 불임을 주소로 내원하였습니다.	30세 여자가 불임을 주소로 내원하였습니다.
55	3번 문제 지문 8번째줄	• 배우자 정액검사 : 정액량 1.5mL(참고치, ≥ 1.5)	• 배우자 정액검사 : 정액량 1.5mL(참고치, ≥ 1.5)
56	5번 문제 선지 3)	3) 방향효소억제제	3) 방향화효소억제제
58	9번 문제 해설 8번째	Berke&Novak's 17판, p.382	Berek&Novak's 17판, p.382
64	3)-(1)	(1) Topical azole drug : Butoconazole, Clotrimazole, Miconazole, Ticonazole, Treconazole	(1) Tioconazole drug : Butoconazole, Clotrimazole, Miconazole, Ticonazole, Terconazole
66	1번 문제 지문 4번째줄	• 나이세리아임균(<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) : 음성	• 나이세리아임균(<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) : 음성
68	6번 문제 지문 5번째줄	• 나이세리아임균(<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) : 음성	• 나이세리아임균(<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) : 음성
69	9번 문제 해설 4번째줄	편모를 가진 <i>Trichomonas vaginalis</i> 가	편모를 가진 <i>Trichomonas vaginalis</i> 가
75	3.-1)	1) N.gonorrhoeae endocervicitis : ~cefexime	1) N.gonorrhoeae endocervicitis : ~cefexime
75	3.-1)-*	* Berek&Novak's 17판의 정보는~ gonococcal	* Berek&Novak's 17판의 정보는~ gonococcal
76	도표 5행 2열	Cefexime, 800mg orally(single dose), or	Cefexime, 800mg orally(single dose), or
76	1번 문제 지문 6번째줄	• 나이세리아임균(<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) : 음성	• 나이세리아임균(<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) : 음성
78	4번 문제 지문 5번째줄	• 나이세리아임균(<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) : 양성	• 나이세리아임균(<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) : 양성
79	8번 문제 해설 8번째줄	Berke&Novak's 17판, p.382	Berek&Novak's 17판, p.382
79	7번 문제 지문 9번째줄	• 임균(<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) : 양성	• 임균(<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) : 양성
80	10번 문제 지문 7번째줄	• 임균(<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) : 음성	• 임균(<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) : 음성
82	5.-1)-(3)-㉔	CDC guideline에 따르면 따르면 다음과 치료하면 된다.	CDC guideline에 따르면 다음과 치료하면 된다.
91	하단 2번째줄	* 임신 중~ Interferon, Imiquimod라고 외우면	* 임신 중~ Interferon, Imiquimod라고 외우면
101	19번 문제 해설 6번째줄	무증상의 batholin's gland cyst 치료는	무증상의 bartholin's gland cyst 치료는
103	단원 제목	골반결핵(Pelvic tuberculin)	골반결핵(Pelvic tuberculosis)
110	1번 문제 지문 6번째줄	혈소판 농도 200,000/mL	혈소판 농도 200,000/ μL
114	10번 문제 해설 17번째줄	fertility, expulsion and perforation이 있을	infertility, expulsion and perforation이 있을
115	11번 문제 해설 6번째줄	㉓ 가임기 : 호르몬~ fibroids, 자궁근종	㉓ 가임기 : 호르몬~ fibroids(자궁근종)
117	2)	prostaglandin(PGE 2α)	PGF 2α
117	2)-(1)	(1) 일차성 무월경이 있는 여성은 보통	(1) 일차성 월경통이 있는 여성은 보통
134	3.-4)-(2)-㉔	㉔ Estrone(E1)~ 의해 aromatization되고	㉔ Estrone(E1)~ 의해 aromatization되고
139	7번 문제 해설 8번째줄	선지 중에서는 2) 경피 에르스토겐이 가장	선지 중에서는 2) 경피 에스트로겐이 가장
149	1번 문제 해설 5번째줄	핵형 검사 사진에서 46,X인 것을 확인할 수	핵형 검사 사진에서 45,X인 것을 확인할 수
156	15번 문제 지문 4번째줄	프로락틴 15.3ng/mL(<25ng mL)	프로락틴 15.3ng/mL(<25ng/mL)
163	8번 문제 지문 7번째줄	에스트라디올 83pq/mL(참고치, 20~443)	에스트라디올 83pg/mL(참고치, 20~443)

페이지	위치	수정 전	수정 후
175	12번 문제 선지 3)	3) 방향 <u>효</u> 소억제제	3) 방향 <u>화</u> 소억제제
178	1. 분류 Box 2번째줄	— clas I. <u>segmented</u> Müllerian agenesis	— clas I. <u>segmental</u> Müllerian agenesis
179	2.-1) 두번째줄	(septate uterus와 <u>bicornuate</u> uterus가 구분이	(septate uterus와 <u>bicornuate</u> uterus가 구분이
187	5.-5)-(2)	(2) 약물 : ~agonist(<u>bathanechol</u>)	(2) 약물 : ~agonist(<u>bethanechol</u>)
197	그림 사진 캡션	K. Cehrung / L. Cellhorn / T. Ring Incontinece W. Inflatobal	K. Gehrung / L. Gellhorn / T. Ring Incontinence W. Inflatoball
205	2.-3)	3) Site of implant : ovary(m/c), cul-de- <u>sec</u> ,	3) Site of implant : ovary(m/c), cul-de- <u>sac</u> ,
209	2번 문제 해설 7번째줄	특징적인 복강경 소견인 “powder <u>gun</u> ”,	특징적인 복강경 소견인 “powder <u>bum</u> ”,
210	4번 문제 해설 선지 1)	1) 난소 <u>낭</u> 종절제	1) 자궁 <u>절</u> 제술
212	8번 문제 해설 3번째줄	ground-glass <u>echogenicity</u> 를 보이는	ground-glass <u>echogenicity</u> 를 보이는
238	14번 문제 해설 10번째줄	크기가 작을 경우 <u>hyteroscopic</u> resection의	크기가 작을 경우 <u>hysteroscopic</u> resection의
250	8.-4)-(3)-* 3번째줄	처치는 만삭 분만 6 <u>개월</u> 후 재평가입니다	처치는 만삭 분만 6 <u>주</u> 후 재평가입니다
251	1번 문제 해설 참고문헌	Practical Obstetrics and <u>Gynedcolohy</u> Handbook for O&G Clinicians and General <u>Practicioners</u>	Practical Obstetrics and <u>Gynecology</u> Handbook for O&G Clinicians and General <u>Practitioners</u>
252	5번 문제 해설 2번째 줄	Pap smear상 HSIL로 나왔고, <u>Colopscopy</u> 결과	Pap smear상 HSIL로 나왔고, <u>Colposcopy</u> 결과
253	9번 문제 선지 2)	2) <u>Cryotherpy</u>	2) <u>Cryotherapy</u>
287	도표 7행 2열	Invasion of the cervical stroma of non- <u>aggressvie</u>	Invasion of the cervical stroma of non- <u>aggressive</u>
290	12.-1)	Advanced <u>endometrical</u> cancer	Advanced <u>endometrial</u> cancer
294	9번 문제 해설 1번째줄	재발의 고위험군은 60세 이상, <u>LSVI</u> (+)	재발의 고위험군은 60세 이상, <u>LTVSI</u> (+)
297	하단 참고문헌	Berek&Novak’s 17판, pp.608~609, <u>1117</u> ~1023	Berek&Novak’s 17판, pp.608~609, <u>1017</u> ~1023
298	2번 문제 해설 참고문헌	Berek&Novak’s 17판, pp. <u>1117</u> ~1023	Berek&Novak’s 17판, pp. <u>1017</u> ~1023
302	9번 문제 해설 1번째줄	두 사진 중 <u>Coronary</u> view CT는	두 사진 중 <u>Coronal</u> view CT는
303	11번 문제 해설 2번째줄	나이가 <u>13세</u> 이므로 난소의 양성 종괴로	나이가 <u>16세</u> 이므로 난소의 양성 종괴로
313	3번 문제 선지 3)	3) 직장자궁 <u>오</u> 목천자	3) 직장자궁 <u>오</u> 목천자
323	5.-* -1.	1. 빈도 : Serous~ <u>mucionous</u> (5%)	1. 빈도 : Serous~ <u>mucinous</u> (5%)
325	8.-6)	6) <u>Supraracolic</u> omentectomy	6) <u>Supracolic</u> omentectomy
328	2번 문제 지문 4번째줄	탐색 개복술을 한 결과 장액성 샘암종 병기 1a1 분화도 1이었다.	탐색 개복술을 한 결과 장액성 샘암종 병기 1a1 분화도 1이었다.
331	9번 문제 지문 4번째줄	탐색적개복술에서 왼쪽 자궁부속기에 크기 <u>8m</u>	탐색적개복술에서 왼쪽 자궁부속기에 크기 <u>8cm</u>
338	3번 문제 해설 3번째줄	골반초음파검사 사진 상~ <u>echogenicty</u> 를	골반초음파검사 사진 상~ <u>echogenicity</u> 를
346	3번 문제 해설 13번째줄	<u>juvenile granulsoa</u> cell tumor의 소견입니다.	<u>juvenile granulosa</u> cell tumor의 소견입니다.
351	도표 7행 2열	<u>II</u> C2 : Capsule ruptured before surgery	<u>I</u> C2 : Capsule ruptured before surgery
	도표 8행 2열	<u>III</u> C3 : Malignant cells present in the ascites	<u>I</u> C3 : Malignant cells present in the ascites
	도표 12행 3열	Tumor involves one or both <u>fallioian</u> tubes with cytologically or histologically confirmed spread to the peritoneum outside of the pelvis and/or <u>metasis</u> to the retroperitoneal lymph nodes.	Tumor involves one or both <u>fallopian</u> tubes with cytologically or histologically confirmed spread to the peritoneum outside of the pelvis and/or <u>metastasis</u> to the retroperitoneal lymph nodes.
	3)-3)	(3) 자궁의 퇴축부전 또는 비대칭 비대(<u>Utertine</u>	(3) 자궁의 퇴축부전 또는 비대칭 비대(<u>Uterine</u>
358	4)-(1)	(1) Molar evacuation~ 또는 <u>choriocarcinma</u>	(1) Molar evacuation~ 또는 <u>choriocarcinoma</u>
360	도표 12행 3열	<u>whole-heat</u> irradiation(3,000cGy)	<u>whole-brain</u> irradiation



페이지	위치	수정 전	수정 후
367	15번 문제 해설 6번째줄	치료는 항암화학요법 또는 자궁절제술을 시행	치료는 항암화학요법 또는 자궁절제술을 시행
370	알고리즘	근치외음부절개술	근치외음절제술
375	10번 문제 해설 6번째줄	근치외음부절개술 및 살고랑 림프절 절제술이	근치외음부절제술 및 살고랑 림프절 절제술이
387	11. 도표 3행 4열	Conizatoin	Conization
388	12.-2)-① 2번째줄	Oral : Medroxyprogesterone(MPA),	Oral : Medroxyprogesterone(MPA),

11 소아과 총론

페이지	위치	수정 전	수정 후
15	2.-1)-도표 3행 3열	연어반(Nevus flammeus Salmon patch)	연어반(Nevus simplex 또는 Salmon patch)
23	12번 문제 해설 1번째줄	신생아에서는 정상이라도 림프절이 만져지는~	소아에서는 정상이라도 림프절이 만져지는~
76	2.-※ 1번째줄	간에서 25-Vit. D ₃ 로 바뀌며, 신장으로 가 활성을 가지는 1,25-Vit. D ₃ 가 됩니다.	간에서 25-(OH)Vit. D ₃ 로 바뀌며, 신장에서 활성형인 1,25-(OH) ₂ Vit. D ₃ 가 됩니다.
114	도표 10행 3열	Haemophilus Influenza type b vaccine	Haemophilus influenzae type b vaccine
256	6.-1)-(3)	stable microbubble rating : 개수가 >20일 때 정상	stable microbubble test : 개수가 >20일 때 정상
296	3.-2)-(2)	(2) ESR, CRP,~ nitroblue tetrazolin dye, IL-6	(2) ESR, CRP,~ nitroblue tetrazolium dye, IL-6
313	2.-2)	2) 자극 과민성, 신경과민(jitterness),	2) 자극 과민성, 신경과민(jitteriness),

페이지	위치	수정 전	수정 후
82	알고리즘	음성 : 8주 후 TST를 반복(단, BCG를 접종 받지 않은 접촉자인 경우에는 기다리는 동안 INH 복용) • 학교 내 접촉자 조사 시 TST 결과가 10~14mm 인 경우에는 추가적인 IGRA 검사를 시행하며 그 결과에 따라 치료 여부 결정 가능 • 일상접촉자를 대상으로 하는 단체 검진에서는 IGRA 단독 사용을 고려 할 수 있음 TST	음성 : 8주 후 TST를 반복(단, 연령과 무관하게, 도말양성 노출 또는 면역저하 소아는 고위험군으로 window기 INH 예방 투여가 필요함) • 학교 등 집단발생 접촉자 조사에서는 TST/IGRA 2단계 검사를 시행하여 IGRA 양성인 경우만 치료를 고려할 수 있다(가족접촉자에는 적용하지 않음). IGRA & TST
83	※ 8번째줄	4주 이상 18세 이하의 소아가 TST에서 경결이 10mm 이상으로 양성이면 잠복 결핵이므로 이에 대한 치료(INH 9개월 요법)를 하면 됩니다. 경결이 10mm 미만이면 8주 후 TST를 반복합니다. 다만 2세 미만이거나 BCG 접종을 받지 않은 5세 미만의 소아는 8주 기다리는 동안 INH를 복용합니다.	4주 이상 18세 이하의 소아가 TST에서 경결이 10mm 이상(BCG 미접종자는 5mm 이상)으로 양성이면 잠복결핵감염이므로 이에 대한 치료(3HR·9H·4R 중 선택)를 하면 됩니다. 경결이 10mm 미만이면 8주 후 TST를 반복합니다. 다만 생후 4주~24개월(2세) 미만의 소아나 면역저하 고위험군(HIV 감염, 장기이식 후 면역억제제·TNF 길항제 사용자 등)은 접촉 후 8주가 지나지 않았다면 초기 검사가 음성이라도 그 기간 동안 INH를 복용하고, 8주 후 재검하여 음성이면 중단, 양성이면 잠복결핵감염 치료를 지속합니다.
83	하단 참고문헌	결핵진료지침 4판, 2020	결핵 진료지침(5판), 2024 / 2026 국가결핵관리지침
83	1번 문제 해설	활동성 결핵 환자와 접촉한 경우의 치료 방침은 꼭 알고 계셔야 합니다. TST와 CXR을 시행하여 활동성 결핵의 증거(CXR 상)가 있으면 다제요법(2HRZE+4HR)을, CXR은 정상이지만 TST 양성(10mm 이상)이면 잠복 결핵에 대한 치료를 해야 합니다. CXR, TST 모두 음성일 때는 연령과 BCG 접종 여부에 따라 달라집니다. 이 증례의 경우엔 CXR(-), TST(+)이므로 9개월간 INH 투약하고 TST는 다시 시행하지 않습니다.	활동성 결핵 환자와 접촉한 소아의 관리는 반드시 알아야 합니다. 접촉자에서는 TST(또는 IGRA)와 흉부 X선(CXR)을 시행하여 활동성 결핵과 잠복 결핵감염 여부를 확인합니다. CXR에 활동성 결핵의 증거가 있으면 다제요법(2HRZE/4HR)으로 치료하고, CXR이 정상이면서 TST가 양성이면 잠복결핵감염으로 진단합니다. TST는 비씨지(BCG) 접종자에서 경결 10mm 이상, 미접종자에서 5mm 이상이면 양성입니다. 본 증례는 4세 소아로 TST 18mm(양성), CXR 정상이므로 잠복결핵감염에 해당합니다. 잠복결핵감염의 치료는 이소니아지드/리팜핀 3개월(3HR), 이소니아지드 9개월(9H), 리팜핀 4개월(4R) 중 선택하며, 국내에는 리파펜틴이 도입되어 있지 않아 3HP 등은 사용할 수 없습니다. 보기 중에서는 이소니아지드 투약(㉓)이 이에 해당하므로 정답은 ㉓이며, TST는 다시 시행하지 않습니다.
88	첫 번째 도표 7행 2열	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>
92	01번 문제 지문 7번째줄	C-반응단백질 78mg/L(참고치, <10)	C-반응단백질 78mg/L(참고치, <10)
99	도표 12행 1일	<i>Clostridium difficile</i>	<i>Clostridioides difficile</i>
165	5.-3)-※ 4번째줄	그리고 진포도젤리 같은 특징적 양상의	그리고 딸기잼(currantjelly) 같은 특징적 양상의



페이지	위치	수정 전	수정 후
268	8.-2)	2) 1세 이상 의식이 없는 소아 : abdominal thrust method 소아를 바닥에 바로 눕히고, 한쪽 손바닥 뒤꿈치를 배꼽과 흉곽(rib cage) 사이의 한가운데에 두고 다른 손을 그 손 위에 얹어 복부를 쳐 올리듯이 다섯 차례 압박한다(inward and upward thrust). 의식이 돌아오지 않을 경우 심폐 소생술을 실시한다.	2) 1세 이상 의식이 없는 소아 : 즉시 심폐소생술(CPR) 시행 소아를 딱딱한 바닥에 눕히고, 무반응을 확인한 즉시 가슴압박을 시작한다(속도 100~120 회/분, 깊이는 흉곽 전후경의 최소 1/3). 인공 호흡 전 매회 입안을 육안으로 확인하여 이물이 보이면 제거되되, 보이지 않는 이물을 찾기 위한 맹목적 손가락 훑기(blind finger sweep)는 시행하지 않는다. 가슴압박:인공호흡을 30:2 비율로 반복하며, 이물이 제거되거나 반응이 회복될 때까지 지속한다. ※ 복부 압박(abdominal thrust)은 의식이 있는 상태에서에만 시행하며, 의식을 잃는 순간부터는 반복하지 않고 즉시 CPR로 전환한다.
281	8번 문제 선지 2)	2) Gentamycin	2) Gentamicin

13 소아과 각론 II

페이지	위치	수정 전	수정 후
52	1번째줄	헤노흐-셴라인 자반병(Henoch-Schönlein purpura, HSP)	IgA vasculitis(Henoch-Schönlein purpura, HSP)
53	하단 도표 제목	Henoch-Schonlein purpura	IgA vasculitis(Henoch-Schönlein purpura)
96	4.-5)-(1)	(1) 관해 유도 시부터 : intrathecal MTX 또는 triple Tx(MTX+cytarabine + hydocortisone)	(1) 관해 유도 시부터 : intrathecal MTX 또는 triple Tx(MTX+cytarabine + hydrocortisone)
211	도표 9행 2열	Adenoma sebaceum	Facial angiofibroma(adenoma sebaceum)
251	2.-3)-(4)	(4) 1st line drugs : Valproic acid, carbamazepine, ethosuximide	(4) 1st line drugs : Valproic acid, levetiracetam
292	1.-3)-(3)-②-• 1번째줄	• 메타콜린, 히스타민 같은 기도 수축제(PC ₂₀ 25mg/mL 이하, FEV ₁ 20% 이상 감소 시 의미)	• 메타콜린, 히스타민 같은 기도 수축제(PC ₂₀ 16mg/mL 이하, FEV ₁ 20% 이상 감소 시 의미)





14

정신과

페이지	위치	수정 전	수정 후
99	1번 문제 답	③	②
129	2.-C.	C. 질병의 계속적인~ 잔구증상 또는 잔류증상	C. 질병의 계속적인~ 전구증상 또는 잔류증상
154	3.-3)-(1)-⑥-※ 3번째줄	정상적 애도반응에 이어~ 주요우울증	정상적 애도반응에 이어~ 주요우울장애
194	1.-5)-(3)	(3) 알코올 중독, 항불안제~ 사회공포	(3) 알코올 중독, 항불안제~ 사회불안장애
258	3.-2)-(4)	(4) 식욕부진증 보다 body image의 왜곡이 덜함	(4) 식욕부진증 보다 body image의 왜곡이 덜함
260	3.-4)	4) 식량이 부족하거나,~ 다른 의학적 도는	4) 식량이 부족하거나,~ 다른 의학적 또는

15 마이너

페이지	위치	수정 전	수정 후
30	3번 문제 지문 2번째줄	5년 전부터 고혈압, 당뇨병, 이상지혈증 을	5년 전부터 고혈압, 당뇨병, 이상지질혈증 을
57	1.-2)-(4)	(4) 감금증후군~ 피질척수로(corticalspinal tract)	(4) 감금증후군~ 피질척수로(corticospinal tract)
94	18번 문제 해설 4번째줄	이런 양상을 보이는 병변은 뇌경색(infract)입니다.	이런 양상을 보이는 병변은 뇌경색(infarct)입니다.
129	3.-*	* 운동신경원 질환은~ 척수의 grey matter 중	* 운동신경원 질환은~ 척수의 gray matter 중
132	하단 오른쪽 그림		
137	1번 문제 선지 2)	2) 글루코코르티코이드	2) 글루코코르티코이드
143	7번 문제 선지 5)	5) 두 개경유자기자극검사	5) 두개경유자기자극검사
157	2번 문제 해설 10번째줄	뇌전증지속상태의 일차 치료인 로라제팜 주사사료	뇌전증지속상태의 일차 치료인 로라제팜 주사료
163	13번 문제 선지 5)	5) phenobarbita	5) phenobarbital
164	15번 문제 선지 4)	4) 카파마제핀	4) 카르바마제핀
245	4번 문제 해설 11번째줄	치료는 항바이러스제 의 전신투여가	치료는 항바이러스제 의 전신투여가
329	2번 문제 해설 11번째줄	치료법으로는 정맥 내 스테로이드제 가	치료법으로는 정맥 내 스테로이드제 가
331	안와파열골절-3)	3) 징후 : 안구~ 눈알함몰(enophthalmos)	3) 징후 : 안구~ 안구함몰(enophthalmos)
360	1번 문제 해설 15번째줄	5) 건성습진은 열창과 비늘 을 보이며	5) 건성습진은 열창과 비늘 을 보이며
372	1번 문제 해설 1번째줄	피진 약물발진을 흥반 반점이나	피질 약물발진을 흥반 반점이나
	1번 문제 해설 7번째줄	항생제를 복용한 병력이 있어 피진 약물발진이	항생제를 복용한 병력이 있어 피질 약물발진이
412	1번 문제 지문 3번째줄	겨드랑 과 음부의 모발은 정상이었고,	겨드랑이 와 음부의 모발은 정상이었고,
421	1번 문제 선지	4) 겨드랑 주근깨	4) 겨드랑이 주근깨
	1번 문제 해설 5번째줄	아래는 겨드랑 주근깨의 사진입니다.	아래는 겨드랑이 주근깨의 사진입니다.
430	3.-1)-(2)	(2) 대부분의~ 방사선 비투과성(radioopaque)	(2) 대부분의~ 방사선 비투과성(radiopaque)
448	3번 문제 선지	2) 요관카테타삽입술(ureteral catheterization) 3) 요도카테타삽입술(urethral catheterization) 4) 피부경유~(precutaneous cystostomy) 5) 피부경유~(precutaneous nephrostomy)	2) 요관카테타삽입술(ureteral catheterization) 3) 요도카테타삽입술(urethral catheterization) 4) 피부경유~(percutaneous cystostomy) 5) 피부경유~(percutaneous nephrostomy)
469	3번 문제 보기 5번째줄	소변 : 잠혈(+3)	소변 : 잠혈(3+)
480	1번 문제 해설 3번째줄	가장 신뢰 할 수 있는 진단방법은	가장 신뢰 할 수 있는 진단방법은
	1번 문제 해설 5번째줄	방광주영 술과 복부 CT에서 조영제	방광조영 술과 복부 CT에서 조영제
575	1번 문제 해설 8번째줄	따라서 척추압박골절이 의심 됩니다.	따라서 척추압박골절이 의심 됩니다.



16

예방의학

페이지	위치	수정 전	수정 후
133	4번 문제 해설 3번째줄	진단기준이 높아지거나 첨가 되면	진단기준이 높아지거나 추가 되면
417	3. 도표 3행 2열	간증상 : SGOT, SGPT 상승	간증상 : AST, ALT 상승
525	3. 2번째줄	의료이용은~ 필요 요인 (need factor)에 의하여	의료이용은~ 필요 요인 (need factors)에 의하여

17 의료법규

페이지	위치	수정 전	수정 후
18	3.-1)-(2)-⑥	⑥ 중앙행정기관간의 보건의료 관련 업무의	⑥ 중앙행정기관 간의 보건의료 관련 업무의
19	8) 구강 보건의료(제43조)	국가와 지방자치단체는 정신질환의 예방과 정신 질환자의 치료 및 사회복지 등 국민의 정신건강 증진을 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.	국가와 지방자치단체는 구강질환의 예방 및 치료와 구강건강에 관한 관리 등 국민의 구강건강 증진을 위하여 필요한 시책을 수립·시행하여야 한다.
84	12번 문제 해설 4번째줄	3) 태아 성~ 제20조제1항에 의해 위법 행위	3) 태아 성~ 제20조제1항에 의해 위법 행위
126	4번 문제 해설 22번째줄	해당 문제에서는 의사 '갑'의 과실을 인정할만한	해당 문제에서는 의사 '갑'의 과실을 인정할만한
312	6번 문제 선지	3) 1월 4) 2월 5) 6월	3) 1개월 4) 2개월 5) 6개월